Nro. I.

Intelligenzblatt

zur

allgemeinen botanischen Zeitung.

Erster Band 1837.

Fortgesetztes Inhalts-Verzeichniss des Herbar. Flor. German., von Reichenbach, Cent. XII.

1101. Zostera minor. Nolte! Rchb. Novit. Z. Noltii Hornem. Fl. dan. t. 2041. Aus dem Baltischen Meere, Prof. Nolte! — 1102. Zannichellia polycarpa. Nolte! Rchb. Fl. germ. n. 7. pl. crit. ic. 1004. Ostsee, Küsten von Holstein u. Schleswig. Prof. Nolte. — 1103. Potamogeton filiformis. Pers. Nolte! sub P. marino L. Rchb. l. c. n. 11. P. setaceum Schum. (non Lin. Web. Thuill.). In süssem Wasser, Salentersee. Juli. Prof. Nolte. — 1104. Potamogeton acutifolius. Link. Rchb. l. c. n. 15. In stehendem Wasser bei Leyden. Dr. Wttewaall. — 1105. Potamogeton oblongus. Viv. l. c. n. 26. In stehendem Wasser bei Leyden. Dr. Wttewaal. — 1106. Typha minima. Funk. l. c. n. 33. Bei Bregenz am Bodensee. Dr. Sauter. — 1107. Nuphar pumilum. DeC. Rchb. Fl. germ. 55. Pl. crit. ic. 231 — 231. Im alten Acherfurth am Zellersee in Salzburg. Juli. Dr. Sauter. — 1108. Lolium mul-

tiflorum. Lam. I. c. 68. Agrostogr. ic. 1345. Bei Bregenz. Dr. Sauter. — 1109. Brachypodium cespitosum. R. S. l. c. 95, et Add. Agrostogr. ic. 1377. Bei Bregenz. Dr. Sauter. — 1110. Calamagrostis litorea. Dec. l. c. n. 152. Agrostogr. ic. 1440. Bei Bregenz. Dr. Sauter. — 1111. Stipa pennata. L. l. c. n. 165. Agrostogr. ic. 1463. An sonnigen Felsen d. Kreuzbergs b. Lofer. v. Spitzel. — 1112. Pollinia Gryllus. Spr. l. c. n. 208. Agrostogr. ic. 1502. Auf Wiesen bei Fiume. Juli. Dr. Noë. — 1113. Festuca Scheuchzeri. Gaud. l. c. 256. Agrostogr. ic. 1560. Bei Bregenz. Dr. Sauter. — 1114. Bromus squarrosus. L. α. l. c. 287. Agrost. ic. 1598. Grössere Form (als n. 912.) von Fiume. Dr. Noë. — 1115. Bromus squarrosus var. β. spiculis velutinis Agrostogr. ic. 1599. l. c. n. 287. var. Bei Bregenz. Dr. Sauter. — 1116. Poa pumila. Host. P. alpina γ. pumila Rchb. Agrostogr. ic. 1629. Krain, Berge um Billichgrätz, Germada &c. Dr. Graf. — 1117. Danthonia calycina. Rchb. Rchb. Fl. germ. n. 362. Agrostogr. ic. 1713—14. Ende Juni und Anf. August, Grosskahlenberg bei Laibach. Freyer, Cust. Mus. Lab. — 1118. Vignea dioica. (L.) l. c. n. 376. Salzburg, auf Sumpfwiesen bei Zell. Dr. Sauter. — 1119. Vignea lagopina (Wahlenb.) l. c. n. 386. Auf der obern Pasterze am Fusse des Grossglockners. Dr. Ruprecht. — 1120. Vignea Grypos. Schk. l. c. n. 384. Auf einer Sumpfwiese bei Bregenz mit V. stellulata und dioica beisammen. Dr. Sauter. —

1121. Carex ornithopoda. W. Rchb. Fl. germ. n. 430. Bei Bregenz. Dr. Sauter. — 1122. Carex ericetorum. Poll. l. c. n. 441. Haide bei Dresden. Mil. Apoth. Müller und Heber. — 1123. Carex hirta. L. l. c. n. 463. et Add. An der Priessnitz bei Dresden. Milit. Apoth. Müller u. Heber. — 1124. Carex Agastachys. Ehrh. l. c. n. 488. Bei Fiume an Gräben, Flussufern. Apr. Dr. Noë. — 1125. Acorus Calamus. L. l. c. n. 38. Salzburg, in den Sümpfen bei Zell ganze Morgen Landes bedeckend. Jul. Dr. Sauter. — 1126. Luzula glabrata. Desv. l. c. n. 625. An feuchten Stellen der Kalkalpen bei Lofer 5—6000′. Juli. v. Spitzel. — 1127. Juncus pygmaeus. Rich. l. c. n. 640. Holstein, auf den Dünen bei Lyst u. s. w. Prof. Nolte. — 1128. Juncus Jacquini. L. l. c. n 644. Feuchte Bergwiesen bei Kitzbühl 3500—4500′. Ap. Traunsteiner. Wasserfallalp im Pinzgau, 5500 – 7000′. Dr. Sauter. — 1130. Leucoium aestivum. L. l. c. 594. Stadtwald bei Laibach. Mai. Freyer, Cust. Mus. Lab. — 1130. Gagea bohemica (Zauschn.) l. c. n. 733. Podbaba bei Prag. Dr. Ruprecht. — 1131. Ornithogalum pyrenaicum. Clus. l. c. n. 746. Auf Wiesen an der Save bei Laibach. Juni. Dr. Freyer. — 1132. Allium ochroleucum. Kit. l. c. n. 771. Idria. Freyer, Cust. Mus. Lab. — 1133. Lilium chalcedonicum. L. l. c. n. 685. Auf Bergwiesen von Idria u. Grosskahlenberg. Jun. Freyer, Cust. Mus. Lab. — 1134. Asparagus tenuifolius. Lam. l. c. n. 808. Fiume, auf schattigen Wiesen

in Rezziae. Dr. Noë. A. silvaticus Kit. Gebüsch nächst der Save. Dr Graf. — 1135. Orchis latifolia. Linnaei! l. c. n. 856. Pl. crit. ic. 769. Bei Bregenz. Dr. Sauter. — 1136. Lycopodium selaginoides. L. l. c. n. 932. Alpgarten b. Reichenhall. Apoth. Funk. — 1137. Juniperus phoenicea L. l. c. 985. Gebüsch auf der Insel Osero. Dr. Noë. — 1138. Pinus Pinea L. l. c. n. 972. Bei Fiume. Dr. Noë. — 1139. Salix myrtilloides. L. l. c. n. 1015. Schlesien, Königshuld bei Oppeln. Ap. Finke. — 1140. Salix cinerea. L. l. c. n. 1028. An Zäunen der Sumpfwiesen im Pinzgau. Dr. Sauter. — 1141. Salix purpurea. L. l. c. n. 1040. Böhmen, Gebüsch an Flussufern. Dr. Ruprecht. — 1142. Salix pruinosa. Wendl. l. c. n. 1046. Schlesien, zwischen Schulenburg u. Nakel bei Oppeln. Apoth. Finke. — 1143. Salix fragilis L. androgyna. l. c. n. 1050. Böhmen, an Flussufern. Dr. Ruprecht. — 1144. Salix Meyeriana. Willd. l. c. n. 1051. Salzburg am Ufer der Saale und Alm bei Saalfelden. Dr. Sauter. — 1145. Daphne Laureola. L. l. c. n. 1004. Waldungen von Idria. Mai. Freyer. — 1146. Aristolochia pallida. W. Kit. l. c. n. 1113. Bei Fiume, Kamerjot, auf Wiesen 1800′. Dr. Noë. — 1147. Aristolochia rotunda. L. l. c. n. 1114. Bei Fiume auf feuchten schattigen Wiesen in Rezziae. Dr. Noë. — 1148. Aristolochia Clematitis. L. l. c. n. 1115. Fiume, in Weingärten. Sommer. Dr. Noë. 1149. Anthemis agrestis. Wallr. l. c. n. 1424. Auf Aeckern bei Leipzig. Dr. Petermann. — 1150.

Aronicum scorpioides. (L.) l. c. n. 1487. Auf Kalkgerölle der höhern Alpen Lofers, 5500 — 6500′. Ende Juli. v. Spitzel. — 1151. Buphthalmum salicifolium. L. l. c. n. 1509. Auf Alpenwiesen bei Bregenz. Dr. Sauter. — 1152. Senecio rupestris. W. K. l. c. n. 1569. pl. crit. 514. 515. Auf Kalkgestein bei Lofer 5 — 6000′. Mai. v. Spitzel. — 1153. Senecio lyratifolius. Rchb. l. c. n. 1574. pl. crit. 258. Fiume, im Wiesengebüsch. Dr. Noë. — 1154. Senecio alpinus. Scop. l. c. 1583. pl. crit. ic. 256. Bei Bregenz. Dr. Sauter. — 1155. Crepis montana. Rchb. l. c. n. 1700. Alpenwiesen bei Bregenz. Dr. Sauter. — 1156. Crepis hyoseridifolia. Rchb. l. c. n. 1701. — Auf Gerölle der höchsten Kalkalpen bei Lofer, nicht unter 6500′ herabsteigend. Anfangs Sept. v. Spitzel. — 1157. Geracium incarnatum. (Jacq.) l. c. n. 1708. Krain auf Bergwiesen gegen Unter-Idria. Ende Juni. Freyer, Cust. Mus. Lab. — 1158. Geracium chondrilloides. (Jcq.) l. c. n 1711. Auf Kalkalpenwiesen bei Lofer von 6 — 7000′. Anf. September. v. Spitzel. — 1159. Hieracium angustifolium. Hoppe. l. c. n. 1721. Geisstein bei Kitzbühel, sonnige Alpenhöhe im Schiefergebirg, 7000′. Anf. Augst. Apoth. Traunsteiner. — 1160. Hieracium incisum. Hpp. l. c. n. 1768. var. An steinigen sonnigen Abhängen bei Lofer. Juni. v. Spitzel. — 1161. Willemetia apargioides. Neck. l. c. n. 1791. Bei Bregenz. Dr. Sauter. — 1162. Scorzonera rosea. W. K. l. c. n. 1843. Alpe Poresen, Goliza, Begunshza in Krain. Jun.

Freyer, Cust. Mus. Lab. — 1163. Scorzonera octangularis. Rth. l. c. n. 1845. An Wegrändern von Prag. Dr. Ruprecht. (Cl. Hornung Bot. Zeit. 1836. 611. docens, Sc. muricatam ignorare videtur.) — 1164. Homogyne sylvestris. H. Cass. l. c. n. 1862. In Voralpenwäldern in Krain. Dr. Noë. — 1165. Cirsium heterophyllum. All. l. c. n. 1905. Auf feuchten Bergwiesen bei Kitzbühl 3500—4500′ gesammelt. September. Ap. Traunsteiner. — 1166. Carlina lanata. L. l. c. n. 1964. Lussin piccolo, einziger Standort. August. Dr. Noë. — 1167. Asterocephalus graminifolius. (L.) l. c. n. 1157. Krain, auf dem Berge Zhaun und Nanas. Juli. Freyer, Cust. Mus. Lab. — 1168. Valeriana tripteris L. l. c. n. 1203. Bei Bregenz. Dr. Sauter. — 1169. Asperula taurina L. l. c. n. 1240. Bei Bregenz. Dr. Sauter. — 1170. Galium vernum. Scop. l c. n. 1264. Krain, bei Idria, und Laibach. April. Freyer, Cust. Mus. Lab. — 1171. Phyteuma Scheuchzeri. All. l. c. n. 2004 An Felsen und Mauern am Flusse Iderza bei Idria. Anf. Juli. Freyer, Cust. Mus. Lab. — 1172. Campanula Zoysii Wulf. l. c. n. 2009. Steyermark, Cillier-Kreis auf der Oestriza an Felsen zwischen 5—6000′. August. Zechenter. — 1173. Campanula pyramidalis L. l. c. n. 2061. Vom Strup in Idria und vom Nanas. Aug. Freyer, Cust. Mus. Lab. — 1174. Myosotis versicolor Rth. l. c. n. 2333. Auf Triften und Kleefeldern bei Dresden. L. R. — 1175. Myosotis sparsiflora Mik. l. c. n.

2334. Um Prag in schattigen Laubwäldern. Dr. Ruprecht. — 1176. Myosotis sylvatica. Ehrh. l. c. n. 2336. M. decumbens Host! Um Laibach. Dr. Graf. — 1177. Omphalodes verna Mnch. l. c n. 2336. Krain, bei Idria und auf dem Berge Grimm, bei Laibach. Freyer, Cust. Mus. Lab. — 1178. Orobanche Salviae Schultz. M. K. IV. 458. l. c. Novit. n. 2423 b. Auf Salvia glutinosa vom Thale bis 4000′ hoch bei Lofer. Ende Juni. v. Spitzel. — 1179. Pedicularis recutita L. l. c. n. 2471. Auf humusreichem feuchten Boden der Alpen bei Lofer: 5—6000′. Anf. Juli. v. Spitzel und Hinterhuber. — 1180. Paederota Ageria L. l. c. n. 2525. Oberkrain vom Berge Steinr u. Manhart. Jul. Freyer, Cust. Mus. Lab. — 1181. Linaria litoralis Bernh. l. c. n. 2534. Fiume, auf Schutt am Meeresufer. Dr. Noë. — 1182. Plantago altissima Jacq. l. c. n. 2680. Morastwiesen bei Laibach. Juni. Freyer, Cust. Mus. Lab. — 1183. Arctostaphylos alpina Spr. l. c. n. 2790. An trocknen steinigen Orten der höheren Alpen bei Lofer, bei 6000′. Anf. Jun. v. Spitzel. — 1184. Arbutus Unedo L. l. c. n. 2791. Jnsel Osero. Oct. — März. Dr. Noë. — 1185. Villarsia nymphoides. l. c. n. 2807. Bei Donauwörth. Apoth. Kinast. — 1186. Gentiana nana Wulf l. c. n. 2824. Spitze des al- nitzer Tauerns und vom untern Käsboden an der Pasterze. Dr. Ruprecht. — 1187. Gentiana Froelichii Wulfen! teste rev. Hladnik. l. c. n. Addenda 2839 Krain, auf den höchsten kahlen Kuppen der

Steiner Alpen. Aug. — Rara! — Dr. Graf. — 1188. Phillyrea media L. l. c. n. 2363. Fiume, an Felsen, März Dr. Noë — 1189. Olea europaea. L. l. c. n. 2865. Fiume, in Weingärten. Juli. Dr. Noë. — 1190. Ligusticum Seguieri Koch. l. c. n. 3030. Vom Berge Golak in Innerkrain. Jul. Freyer. Cust. Mus. Lab. — 1191. Pteroselinum glaucum. l. c. n. 2943. Pastinaca glauca. Scop. Peuced. saxatile Ktzg. petraeum Koch. Fiume Felsen, auf schattigen Wiesen. Aug. Dr. Noë. — 1192. Heracleum siifolium. Rchb. l. c. n. 2958. Oberkrain, Begunshza u. Goliza-Alpe. Freyer. Cust. Mus. Lab. — 1193. Pastinaca selinoides. Vis. l. c. n. 2971. P. Fleischmanni Hladn.! Auf dem Schlossberge in Laibach. Freyer, Cust. Mus. Lab. — 1194. Oenanthe silaifolia. M. B. l. c. n. 2994. Krain, Sumpfwiesen um Laibach. Dr. Graf. — 1195. Rhamnus saxatilis L. l. c. n. 3112. An sonnigen trockenen Mähdern bei Unken, unweit Lofer. Anf. Juni. v. Spitzel. — 1196. Rhus Cotinus L. l. c. n. 3126. Fiume, Mai. Dr. Noë. — 1197. Trifolium noricum. Wulf. l. c. n. 3164. In der Wochein, vom Berge Steiner an dem Terglou und der Zhernaperst. Juli. Freyer, Cust. Mus. Lab. — 1198. Medicago orbicularis All. l. c. n. 3215. Fiume, auf Wiesen. Dr. Noë. — 1199. Medicago carstiensis. Wulf. l. c. n. 3221. Krain, Berge um Laibach. Dr. Graf. — 1200. Medicago mollissima Roth. l. c. n. 3227. Fiume, auf Wiesen. Mai. Dr. Noë.

Berichtigende Etiquetten für diejenigen, welche unter diesen Nummern ausgegeben worden, jetzt aber zu cassiren sind:

145. Carex vaginata. Tsch. l. c. n. 435. excl. nom. Vom Brocken am Harz. Apoth. Hampe. — 402. Agropyrum pungens. R. S. l. c. n. 102. Agrostogr. ic. 1392. An trockenen Orten am baltischen Meere bei Warnemünde. Dr. Detharding. — 546. Juncus glaucus. Ehrh. l. c. n. 633. Am südl. Littorale. Dr. Noë. — 822. Laserpitium Siler. L. l. c. n. 2929. Salzburg, 5400! v. Spitzel. — 827. Artemisia Mutellina L. l. c. n. 1384. Gamsgrube b. Heiligenblat bis 9000′. F. Ruprecht. — 798. Dianthus caesius Sm. l. c. n. 5044. M. de Trelod in Savoyen. Mr. Huguenin. — 840. Cirsium spinosissimum. Nachtrag. 728. Salix Wulfeniana. Nachtrag. — 729. Salix grandifolia. Nachtrag. — 931. Eriophorum angustifolium. Rth. l c. n. 353. Sumpfwiesen bei Dresden. Mil. Apoth. Müller u. Heber. Nachtrag: Blüthe.

Flora germanica exsiccata Centuria XIII. erscheint zu Ostern 1837.

---

prüfung als Apotheker Erster und Zweiter Klasse zu machen beabsichtigen. Wir empfehlen dasselbe daher den genannten Herren Apothekern, so wie auch den Herren Principalen, welche wohl nicht leicht ein geeigneteres botanisches Werk ihren Lehrlingen in die Hände geben können. Als einen Beweis der Brauchbarkeit führen wir nur an, dass es bereits im hiesigen pharmaceutischen Institut als Leitfaden beim botanischen Unterricht eingeführt ist.

Nauck'sche Buchhandlung
iu Berlin.

Für Garten- und Blumenfreunde.

In der Nauck'schen Buchhandlung in Berlin ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Allgemeine Gartenzeitung. Eine Zeitschrift für Gärtnerei und alle damit in Beziehung stehende Wissenschaften. In Verbindung mit den tüchtigsten Gärtnern und Botanikern des In- und Auslandes, herausgegeben von Friedr. Otto, Königl. Preuss. Garten-Direktor und Inspektor des botan. Gartens zu Berlin, Albert Dietrich, Doctor der Philosophie und Lehrer der Gärtner-Lehranstalt zu Berlin. Fünfter Jahrgang 1837.

Von dieser Zeitschrift erscheint in jeder Woche ein Bogen in gr. 4. 52 Bogen bilden sonach einen vollständigen Jahrgang und kosten 4 Rthlr. —

Macht es der Inhalt nothwendig, so erscheinen auch Kupfer hierzu, jedoch ohne den Preis zu erhöhen. Von den vorhergehenden vier Jahrgängen sind noch einige Exemplare für obigen Preis zu haben.

Mein Naturalientausch-Unternehmen am Schlusse des Jahres 1836.

Am Schlusse des Jahrs 1836 zählte mein Unternehmen 542 Herren Abnehmer, es hat sich demnach um 9 vermehrt.

Bis jetzt sind:

Pflanzen.	*Insekten.*	*Conchylien.*
727,251 Ex.	94,804 Ex.	75 Ex. eingeliefert,
597,448 Ex.	57,901 Ex.	20 Ex. an die einzelnen

Sammlungen abgegeben worden, es sind demnach noch vorräthig:

129,803 Ex.	36,903 Ex.	55 Exemplare.

Bei *Pflanzen* lieferten im Jahr 1836 die meisten Exemplare ein: P. M. Opiz in Prag 5238 Exemplare; Herr Kaplan Cenek in Holic chrudiner Kreises 3,842 Exempl.; Herr Professor Hinterhuber in Salzburg 3,324 Ex.; Herr Wundarzt Langer in Reichenberg 2177 Exempl.; Herr Apotheker Ortmann in Karlsbad 1,296 Exempl.

Die *meisten schön und charakteristich getrockneten Pflanzen* Herr Bergwerksarzt Wierzbicki zu Oraviza im Banat; Herr Wundarzt Lan-

ger in Reichenberg; Herr Wundarzt Benesch zu Mödling nächst Wien.

Die *meisten Species* haben abgegeben: P. M. Opiz in Prag 284 Species; Herr Naturforscher Ruff zu Guben in der Niederlausitz 230 Spec.; Herr Prof. Hinterhuber in Salzburg 171 Spec.; Herr Kaplan Cenek zu Holic 142 Spec.

Das *meiste Seltene* lieferte ein: Herr Bergwerksarzt Wierzbicki zu Oraviza im Banat; Herr Professor Hinterhuber in Salzburg; Frau Apothekerin Josephine Kablik in Hohenelbe.

Die *entfernteste Sendung* machte: Herr Bergwerksarzt Wierzbicki zu Oraviza mit Pflanzen aus dem Banat; Herr Professor Hinterhuber zu Salzburg mit Pflanzen aus der Gegend von Triest.

Bei *Insekten* lieferte ein die *meisten Exemplare* Herr M. Ferdinand Stifter in Prag 1289 Exemplare.

Die *meisten Species:* Herr M. Ferd. Stifter in Prag 272 Species; Herr Burggraf Kaliwoda zu Cernjkowic Königgräzer-Kreises 181 Spec.

Bei *Conchylien* wurde auch dieses Jahr gar nichts eingeliefert.

Die meiste Theilnahme fand bei Pflanzen, fast gar keine bei Insekten, und wieder gar keine bei Conchylien Statt. Für Pflanzen haben sich im Jahr 1836 vorzugsweise Wundärzte und Geistliche interessirt; Oekonomen und Technologen leisteten dieses Jahr gar nichts.

Mein Unternehmen kann sich nur dadurch zum

allseitigen Vortheil der einzelnen Herr Abnehmer der möglichsten Vollkommenheit nähern, wenn recht viele aufrichtig gesinnte, eifrige und entfernte Abnehmer zuwachsen. Möge daher jeder einzelne Herr Abnehmer seine naturhistorischen Freunde hiezu aufmuntern. Insbesondere ist im Jahr 1837 mein Unternehmen dazu geeignet, dem Naturalientausche ein Central zu bieten, weil in diesem Jahre die Versammlung deutscher Aerzte und Naturforscher in Prag Statt finden wird, wo sich die Herren Naturforscher von dem Ganzen meines Unternehmens die Ueberzeugung verschaffen können, so wie von dem Umstande, dass es selbst dem schwächsten Anfänger möglich sey, unter der aufrichtigen Leitung Weitervorgerückter an meinem Unternehmen eifrigen Antheil zu nehmen, diess geht schon daraus hervor, dass ich

a) Alles, was in meinem in Oken's Isis bekannt gemachten Vorrathsverzeichnisse nicht steht in . . . . 60 Expl.
b) Alle authenthischen Gegenstände in 100 Expl.
c) Alles was in meinen gedruckten Verzeichnissen noch nicht als wild gewachsen bezeichnet erschien in 100 Expl.
d) Alles was noch gar nicht eingeliefert wurde in . . . . 150 Expl.
e) Alle neuen Gegenstände von den Herren Entdeckern selbst in . . 600 Expl.

annehme.

Wer sein streng alphabetisch gereihtes Her-

barsverzeichniss einsendet, und Alles nimmt, was dieses nicht enthält, oder wer die Mühe der Verfassung eines solchen Verzeichnisses scheuet, und jede Species, welche eingeliefert wird, nimmt, für dessen Herbarsvervollständigung kann ich fortgesetzt Sorge tragen.

Dass die Eifrigen auch hinlänglich entschädiget werden, gehet aus den heurigen Prämien hervor, denn P. M. Opiz in Prag, welcher bereits im Jahr 1835 für 100: 150 erhielt, und welcher im Jahr 1836 die meisten Exemplare, so wie die meisten Species einlieferte, hat vom 1. Januar 1837 für 100: 250 Ex. zu erhalten; Herr Bergwerksarzt Wierzbicki zu Oraviza im Banat, welcher die meisten schön und charakteristisch getrockneten Pflanzen, die meisten Seltenheiten einlieferte, auch die entfernteste Sendung machte, da derselbe schon im J. 1833 für 100: 300; im J. 1834 für 100: 700 Exempl. erhielt, gegenwärtig für 100: 1300 Exemplare.

Am Schlusse muss ich nur noch bemerken: dass ich von mehreren Herrn Theilnehmern ermächtiget bin, von ihren Forderungen Pflanzen zu verkaufen, und dass der Verkaufspreis für diese Pflanzen mit 2 fl. C. M. für eine Centurie bestehet, doch muss ich um frühere portofreie Einsendung des Betrages ersuchen.

Prag am 15. Januar 1837.

P. M. Opiz,
Altstadt, Zeltnergasse Nro. 565.
im dritten Stock.

Programme de la Société Teylérienne pour l'Année 1837.

La Société, considérant, que malgré les recherches continuées, l'explication du mouvement des fluides dans les plantes offre toujours beaucoup d'incertitude et de doutes, tant par rapport aux organes par lesquels il se fait et à son procédé qu'à l'égard de sa véritable cause: désirant que cet important sujet de la physiologie végétale soit ultérieurement éclairci par de nouvelles recherches, elle demande :

Une déscription exacte et succincte, confirmée par des observations et des expériences, du mouvement de la sève dans les plantes, surtout en égard aux questions suivantes. Quels sont les organs, dans lesquels le mouvement de la séve est effectué? Les organes, par lesquels les premiers fluides, tirés du sol et portés dans la plante jusqu'aux bourgeons et aux feuilles, diffèrent-ils de ceux qui reconduisent les sucs élaborés et nutritifs? Y a t-il des fluides aëriformes, qui accompagnent la séve et qui se meuvent avec elle? Doit-on attribuer aux vaisseaux spiraux une fonction particulière et differente de celles des autres organes? conduisent-ils des fluides gazeux on liquides, ou bien les uns et les autres? Quelle est la différence entre le mouvement des fluides contenus dans les vaisseaux et celui dans le tissu cellulaire? Doit-on admettre avec M. M. C. H. Schultz et Meyen, et comme suffisamment prouvé, un système particulier et géné-

ral de vaisseaux, destinés à conduire les fluides préparés et nourriciers? Enfin, jusqu'a quel point les observations et les opinions touchant ce sujet, exposées dans le mémoire de M. Girou de Buzareingues, *sur la distribution et le mouvement des fluides dans les plantes (Annales des Sciences naturelles 2me Série, Botanique* 1836 *p.* 226*)* sont elles confirmées par des observations réitérées?

Le prix fixé pour la meilleure réponse, qui sera jugée satisfaisante, est une Medaille d'or, frappées au coin de la Sociéte, de la valeur de *f*400:— de Hollande.

Les reponses doivent être anonymes, écrites d'une bon main, autre que celle de l'auteur, en langue Hollandoise, Latine, Françoise, Angloise ou Allemande, en caractéres antiques, étant accompagnées d'un billet qui contienne le nom et l'addresse de l'auteur, avec la sentence dont les pièces seront signées. Elles doivent ètre envoyées à la maison de la Fondation Teylérienne à Haarlem, avant le 1 Janvier 1838.

Von Martius Prachtwerk: *Palmae brasil.* ist das sechste Heft im Januar 1837 erschienen.

Nro. II.

Intelligenzblatt

zur

allgemeinen botanischen Zeitung.

Erster Band 1837.

Unter Leitung des Herrn Professor El. Fries erscheint in Lund und Upsula à 12 gr. sächs. die Decade:

Herbarium normale plantarum rariorum et criticarum Sveciae.

Der erste Fascikel, von 8 Decaden, ist bereits ausgegeben und durch die Gyldendal'sche Buchhandlung in Copenhagen zu beziehen; die darin enthaltenen Pflanzen sind alle von H. H. Ringius in Schonen gesammelt, und sehr gut und sauber aufbewahrt; sie bestehen aus folgenden Arten:

Synantherae:	1. Gnaphalium luteoalbum L.
	2. Filago montana L.
	3. — minima Fr.
	4. Senecio erucifolius L.
	5. Cineraria palustris L.
	6. — campestris Retz.
	7. Tussilago Petasites L.
	8. Picris hieracioides L.
Dipsaceae:	9. Asterocephalus suaveolens Wal.
Boragineae:	10. Myosotis silvatica Hoffm.

Boragineae:	11. Myosotis collina Reich.
	12. — versicolor Smith.
	13. — stricta Link.
	14. Pulmonaria angustifolia L.
Labiatae:	15. Lamium intermedium Fr.
	16. Ajuga alpina L.
	17. Teucrium Scordium L.
	18. Mentha sylvestris L.
	19. Verbena officinalis L.
Personatae:	20. Antirrhinum Elatine L.
Primulaceae:	21. Lysimachia nemorum L.
	22. Centunculus minimus L.
Plantagineae:	23. Plantago Coronopus L.
Umbelliferae:	24. Silaus pratensis Bess.
	25. Sium angustifolium L.
	26. Helosciadium inundatum Koch.
	27. Bupleurum tenuissimum L.
Cruciferae:	28. Barbaraea praecox Br.
	29. Alyssum calycinum L.
	30. — incanum L.
	31. Teesdalia nudicaulis Br.
	32. Reseda Luteola L.
Papaveraceae:	33. Corydalis cava Whlb.
Ranunculaceae:	34. Pulsatilla pratensis Willd.
Hypericineae:	35. Hypericum humifusum L.
Gruinales:	36. Geranium molle L.
Caryophylleae:	37. Dianthus arenarius L.
	38. Cerastium strigosum Fr.
	39. — semidecandrum L. β. viscid.
	40. Holosteum umbellatum L.

Caryophylleae:	41.	Alsine viscosa Schreb.
	42.	Sagina ciliata Fr.
	43.	— stricta Fr.
Calycanthemae:	44.	Circaea Lutetiana L.
Succulentae:	45.	Saxifraga Hirculus L.
Leguminosae:	46.	Genista pilosa L.
	47.	Medicago minima Willd.
	48.	Lotus siliquosus L.
	49.	Astragalus arenarius L.
	50.	Lathyrus tuberosus L.
Senticosae:	51.	Potentilla opaca L.
Euphorbiaceae:	52.	Euphorbia exigua L.
Polygoneae:	53.	Rumex Nemolapathum Ehrh.
	54.	— maritimus L.
Chenopodeae:	55.	Amaranthus Blitum L.
	56.	Atriplex hastata L.
	57.	Halymus pedunculatus W.
Urticeae:	58.	Parietaria officinalis L.
Amentaceae:	59.	Fagus silvatica L.
	60.	Salix fragilis L.
	61.	— viridis Fr.
	62.	— alba L.
	63.	— lanceolata Ser.
	64.	— viminalis L.
	65.	— mollissima Willd.
Orchideae:	66.	Orchis Morio L.
Liliaceae:	67.	Ornithogalum spathaceum Hayn.
Juncaceae:	68.	Juncus balticus Willd.
	69.	— glaucus Ehrh.
	70.	— obtusiflorus Ehrh.

Juncaceae:	71. Juncus capitatus Weig.
Cyperaceae:	72. Schoenus ferrugineus L.
	73. Scirpus setaceus L.
Gramineae:	74. Arundo baltica Flgg.
	75. Panicum crus galli L.
	76. Digitaria humifusa Pers.
	77. Aira canescens L.
	78. Koeleria glauca DC.
	79. Bromus pratensis Ehrh.
	80. — sterilis L.

Ankündigung von Pflanzensammlungen.

Plantae selectae Florae Bohem. Fasc. III. editio II.:

Anemone alpina, et β. sessiliflora, Adonis vernalis, Arabis sagittata, sudetica Tausch. *Halleri, Cardamine Opizii Presl, impatiens β. apetala, *Thlaspi montanum, Teesdalia nudicaulis, Viola rupestris Schmidt, *montana et *β. lactea Sm. Polygala multicaulis Tausch. Stellaria linoides Tausch. *Cerastium alsinifolium Tausch. Spergula nodosa, Silene nemoralis, *Linum flavum, *Sedum Rhodiola Cand., rubens Haenke, Prunus petraea Tausch., Pyrus sudetica Tausch. *Potentilla opaca, *Lindackeri Tausch. Myriophyllum pectinatum, et β. brevifolium, Hydrocotyle vulgaris (Schkuhriana Reichb.) Bupleurum longifolium β atropurpureum, Crepis grandiflora W. *Hieracium pratense Tausch. *cymosum, *brachiatum Bert. *Bauhini Schult. *collinum β. dentatum, et *γ heterodoxum, *alpinum ε.

macrocephalum Tausch. *sudeticum γ dentatum Tausch. *decipiens Tausch. *apiculatum Tausch. *murorum β incisum Tausch. inuloides Tausch. prenanthoides ε. integerrimum, et ζ. leucothecum, *Apargia hispida β nigricans, Scorzonera purpurea, Carduus Personata, *Cirsium rivulare, Gnaphalium norvegicum, Artemisia scoparia, *absynthioides Tausch., Cacalia Petasites, Cineraria aurantiaca β. capitata, Solidago alpestris, *Valeriana sambucifolia (cum stolon.), *Vinca intermedia Tausch., Gentiana asclepiadea β. albiflora, lancifolia, *pratensis Froehl., Swertia perennis β grandiflora, *Thymus hortensis Tausch. Veronica alpina β rotundifolia, pilosa Schmidt, *Melampyrum commutatum Tsch. *Euphrasia retusa Tsch. *Rhinanthus alpinus Baumg. Primula minima γ. grandiflora, et δ. biflora, *Euphorbia palustris, *Rumex alpinus, Salix pulverulenta Tsch. albiphila Tsch. multiglandulosa Tsch. et *β latifolia, *rupicola Tsch., et *β. latifolia, *argyroides Tsch., *stricta Tsch., *riphaea β incana Tsch., *sphenogyna ♂, *arenaria δ. atropurpurea, *s. latifolia, et *ζ marrubiifolia Tsch. *bicolor β androgyna Tsch. *heliciflora Tsch. *rubra γ angustifolia Tsch. silesiaca, ε. pilosa, ζ. momonadelpha, η dasycarpa calvesceus, *ϑ macrostachya, et *ι oblongifolia Tsch. Betula carpathica, *Veratrum Lobelianum Bernh. Juncus obtusiflorus, acutiflorus, uliginosus β. fluitans, squarrosus, Phleum alpinum β. viride, *Poa compressa β. effusa, *Scirpus cespitosus, *Carex paradoxa, tereciuscula, irri-

gua, lepidocarpa Tsch. *Woodsia hyperborea, *Asplenium Serpentini Tsch., et *β incisum, *Struthiopteris germanica. Der Preiss ist 10 fl. C. M. Für die Herren, die bereits die erste Ausgabe dieses Fascikels abgenommen haben, sind die neu zugewachsenen mit * bezeichneten Arten abgesondert um 5 fl. C. M. zu haben. Von den zwei ersten Fascikeln, deren Inhalt bereits in der Flora abgedruckt ist, sind wieder neue Exemplare aufgelegt, und einzeln um 10. fl. C. M. zu haben.

Collectio Hieraciorum et Salicum Sudetorum.

Auf vieles Nachfragen um diese vorliegenden Gattungen habe ich mich entschlossen, auch von selben separate Sammlungen zu veranstalten, deren Inhalt hier aufzuzählen zu weitläufig und überflüssig wäre, da fast alle diese Arten in meinen plantis selectis Florae Boh. aufgeführt sind. Diese Sammlung enthält 60 vollständige specimina, und kostet 8 fl. C. M.

Ferner sind vorräthig:

Dendrotheca Bohemica, 2 Lieferungen mit Supplementen enthaltend 227 Arten . .	19 fl. C. M.
Dendrotheca Exotico-Bohemica, 4 Lieferungen mit 380 Arten	28 „ „ „
Agrostotheca Bohemica mit 256 Arten	18 „ „ „
Herbarium Flora Boh. universale mit 2050 Arten	133 „ „ „

P. Ign. Fr. Tausch,
Prag, Viehmarkt Nro. 500.

Rumphia, sive Commentationes Botanicae imprimis de plantis Indiae Orientalis, tum penitus incognitis, tum quae in libris Rheedii, Rumphii, Roxburghii, Wallichii, aliorum recensentur. Scripsit C. L. Blume cognomine Rumphius.

Prospectus.

Da die Fortsetzung der sehr vortheilhaft bekannten *Flora Javae*, welche in Brüssel erschien, durch den politischen Zustand der Niederlande bis jetzt eine anhaltende Störung erlitten, hat endlich der Verfasser den lebhaften und wiederholten Anforderungen des Publikums nachgegeben, und uns den Verlag eines Theils seiner reichen Manuscripte über die Vegetation der ostindischen Besitzungen überlassen. Dieser Theil besitzt einen um so grösseren Werth, da er die seltensten, grösstentheils kaum den Namen nach bekannten Gegenstände der Flora jener Länder aufs gründlichste behandelt, die der Verfasser während seines langen Aufenthaltes daselbst selbst Gelegenheit hatte in der Natur zu beobachten und zu studiren, wobei aber weder die Leistungen seiner Vorgänger, noch die neuerer Schriftsteller unberücksichtigt geblieben sind.

Das Werk erscheint unter dem oben angezeigten Titel in lateinischer Sprache, in demselben Formate als die *Flora Javae*, wovon es gewissermassen nicht sowohl als eine Fortsetzung anzusehen ist, sondern auch den vorzüglichsten Publikationen, die über die Flora Ostindiens erschienen sind, ganz

besonders aber denen von Rheede und Rhumphius, dem gegenwärtigen Zustande der Wissenschaft gemäss, zu näherer Beleuchtung und Ergänzung gereicht. Nicht allein, dass darin sehr genaue Beschreibungen und Abbildungen der seltensten und merkwürdigsten Pflanzen Ostindiens aufgenommen werden sollen, wird es auch höchst wichtige Bemerkungen sowohl über ihre Arzneikräfte, als ihre Brauchbarkeit für Oekonomie u. s. w. enthalten. Dabei liegt der Einrichtung dieser schönen Unternehmung noch die Absicht zum Grunde, die herrliche Vegetation der durch den Vesfasser bereisten tropischen Länder, auch andern so anschaulich als möglich zu machen. Zur Erreichung dieses Zweckes ist der Verfasser auf den glücklichen Gedanken gekommen, diesem Werke *zwölf* Ansichten, welche die charakteristischen Formen jener üppigen Vegetation aufs genaueste darstellen, beizufügen. Dieselben sind durch die Meisterhand des Herrn Payen, am Orte selbst, theils für die königl. Niederländische Gemäldesammlung, theils für Rechnung des Verfassers eingeführt, und werden alle durch den berühmten lithographischen Landschaftszeichner Lauters, mit der ihm eigenen Genauigkeit in Stein gebracht.

Ein solches Werk ist daher jedem Botaniker, und überhaupt jedem Naturforscher, der näher und gründlich mit der ostindischen Vegetation bekannt zu werden wünscht, durchaus unentbehrlich. Aber vom grössten Nutzen muss es auch für den Arzt

seyn zur Kenntniss so vieler durch die Erfahrung der Asiatischen Völker als kräftig erwiesener Arzneimittel, deren jene Länder so viele liefern: so wie es sich endlich jedem anempfiehlt, dem daran gelegen liegt, sich über die Erzeugnisse jener von der Natur so reichlich beschenkten Länder aus ächten Quellen belehrt zu wissen.

Bedingungen der Subscription.

Das Werk soll aus *drei* Bänden in Folio bestehen, auf Velinpapier mit neuen Typen aus der Giesserei von Didot gedruckt. Es erscheint in *sechsunddreissig* Lieferungen, wovon alle drei Monate zwei bis drei ausgegeben werden. Jede Lieferung enthält *sechs* Tafeln von dem angegebenen Formate, oder nur *drei* von doppeltem Umfange, nebst *drei* bis *vier* Bogen Text.

Die Abbildungen, von welchen der grösste Theil aufs sorgfältigste colorirt ist, sollen vorzugsweise nur neue Gattungen und Arten darstellen, und werden von geschickten Künstlern auf Stein ausgeführt. In diesem Werke soll keine Abbildung der *Flora Javae*, die so bald nur immer möglich fortgesetzt wird, wiederholt werden.

Der Subscriptionspreis jeder Lieferung ist auf drei Thaler Preuss. Courant festgesetzt, und wird bei der Ablieferung gleich bezahlt. Nach Herausgabe der zwölf ersten Lieferungen, welche gegen April 1837 erfolgt, wird der Preis um einen Thaler für jede Lieferung erhöht.

Der erste Band, wovon bereits neun Lieferungen mit 30 Bogen Text zum Versenden bereit liegen, zerfällt in die folgenden Abtheilungen:

I. Anerkennung und Belobung der Verdienste des berühmten Rumph, wobei ein *Fac simile* seiner Namen Schrift, und der seines Sohnes mitgetheilt wird.

II. Ueber einige neue Gattungen der *Melastomeen*, mit 8 colorirten Abbildungen.

III. Ueber die *Cinnamomum* Arten, wovon die *Culilawan*-Rinde und die *Tamalapathra*-Blätter erhalten werden, zu welcher Abtheilung 13 grösstentheils colorirte Tafeln gehören.

IV. Ueber das *Upas-Gift*, mit 2 Tafeln, wovon die eine colorirt, die andere diesen merkwürdigen Baum, so wie er sich in den östlichen Theilen Java's in gebirgigten Gegenden findet, nach einem Gemälde von Payen angefertigt, vorstellt.

V. Ueber das *Tieute-Gift*, so wie über das *Lignum colubrinum*. Hier erhalten wir endlich ausführliche Beschreibungen und auf den 2 dabei gefügten Tafeln genaue Abbildungen dieser interessanten Gewächse, die bis dahin nur höchst unvollkommen bekannt waren.

VI. Beiträge zu einer Monographie der *Aroideae* mit 13 prachtvollen Abbildungen, worunter 11 colorirt sind.

VII. Ueber gewisse *Pandaneae* der ostindischen Flora, wozu 5 colorirte Tafeln gehören.

VIII. Erläuterung einer neuen Gattung der *Laurineae*, mit 4 colorirten Tafeln.

IX. Ueber einige ostindische *Passifloren*, mit 5 colorirten Tafeln.

X. Beschreibung einer weniger giftigen *Antiaris* Art aus Timor, mit 1 colorirten Abbildung.

XI. Ueber die Familie der *Myristiceae* mit 10 colorirten Tafeln.

XII. Beschreibung der javanischen *Vanilla* Arten und einer andern damit verwandten Gattung, mit 4 colorirten Tafeln.

Ausser der oben erwähnten Ansicht des *Upas*-Baumes, sind diesem Bande noch die folgenden herrlichen Gemälde, zur Erläuterung der ostindischen Vegetation beigefügt:

Tab. 26. Ansicht der Cascaden im malabarschen Gebirge, aus der Pflanzenregion der *Amentaceae.*

Tab. 38. Ein javanischer Urwald, aus der Pflanzenregion der *Artocarpeae.*

Tab. 53. Die Inseln *Banda*, mit der littoralen Vegetation.

Man unterzeichnet in *Düsseldorf* bei den Endesgenannten und in den vorzüglichsten Buchhandlungen des In- und des Auslandes, und ist gebeten, Namen, Stand und Wohnort genau einzutragen, weil die Liste der H. H. Subscribenten dem dritten Bande des Werkes vorgedruckt wird.

Düsseldorf, Januar 1837.

Die Verleger:

C. G. Sulpke, in Amsterdam.

Arnz & Comp., in Düsseldorf.

Für Aerzte, Pharmaceuten, Forstmänner u. s. w.

In jeder Buchhandlung ist zu haben:

Wilbrand, Dr. J. B., (Grossh. Hess. Geh. Med. Rath und Professor zu Giessen,) Handbuch der Botanik nach den natürlichen Pflanzenfamilien, nebst einer Uebersicht der Pflanzengeschlechter nach dem Linné'schen Sexualsystem als Einleitung in die natürlichen Familien für Nichtkenner derselben, enthaltend die Diagnosen der in Deutschland wildwachsenden, und aller merkwürdigen ausländischen Gewächse, nebst erläuternden Bemerkungen über das Vaterland, über ihre etwaige Nutzanwendung u. s. w. Zum Handgebrauche beim Aufsuchen unbekannter Pflanzen für Aerzte, Pharmaceuten, Cameralisten, wissenschaftliche Forstmänner und jeden wissenschaftl. Pflanzenforscher, welcher mit den Pflanzenfamilien näher vertraut werden möchte. gr. 8. 1837. 3 Thlr. oder 5 fl. 24 kr.

Der gelehrte Verfasser äussert sich über Inhalt und Zweck dieses Buchs folgendermassen:

„Dieses Handbuch hat die Bestimmung, vom *Linné'schen System aus das Studium der natürlichen Pflanzenfamilien*, wie dieselben *jetzt* von den verschiedenen Pflanzenforschern aufgestellt werden, *einzuleiten.* Zu diesem Zweck findet sich zuvor eine Uebersicht des Linné'schen Systems, darauf folgt eine Aufzählung sämmtlicher im Buche aufgeführten Pflanzengeschlechter nach diesem Systeme. Hierauf folgt eine systematische Uebersicht

sämmtlicher natürlichen Familien unter drei Stufen und dreizehn Pflanzenkreise vertheilt."

„Es ist jetzt an der Zeit, dass das *Studium* der Botanik nach den natürlichen Familien auch in Deutschland allgemeiner wird; — in Frankreich und England ist diese sogenannte natürliche Methode schon die gewöhnliche. In meinem früheren Handbuche habe ich schon darauf hingearbeitet, — aber die Linné'sche Methode, als die gebräuchlichere, zur Richtschnur genommen; in dem jetzigen dagegen nehme ich die natürliche Methode zur Richtschnur, und suche die Linné'sche für die Nichtkenner zu benutzen, um diese zur natürlichen hinüber zu führen."

Der unterzeichnete Verleger hat sich bemüht, durch deutlichen, alles Vorkommende gehörig unterscheidenden Druck, durch gutes Papier und einen wohlfeilen Preis dieses gediegene Werk brauchbar und Jedermann zugänglich zu machen.

Darmstadt, den 10. April 1817.

C. W. Leske.

Nachricht.

Seit dem Beginnen meiner zwanzigjährigen Laufbahn als akademischer Lehrer habe ich keine Frage meiner werthen Herren Zuhörer so oft gehört und vielleicht keine so ungenügend beantworten müssen, als die:

„welches Buch sollen wir uns anschaffen, um die Pflanzen, die wir finden, analysiren

und bestimmen zu lernen; dann die Bestimmungen mit bildlicher Darstellung vergleichen und prüfen zu können?“

Es ist allbekannt, dass ausser Schkuhr's Handbuch für diesen Zweck, besonders für dessen letzteren Theil, kein Buch existirt, welches man dem Anfänger zum Ankauf empfehlen könnte, und dennoch ist auch Schkuhr's schätzbares Handbuch noch viel zu theuer, um jedem zugänglich zu werden, und viel zu unvollständig und von den heutigen Ansichten zu abweichend, um den Anforderungen unserer Zeit entsprechen zu können. Der deshalb schon seit lange von mir gefasste Entschluss:

ein praktisches deutsches Botanisirbuch

selbst zu bearbeiten, war aber wegen der gewiss auch von andern gefühlten grossen Schwierigkeit, einen recht zweckmässigen Plan dazu festzustellen und diesem Plane gemäss ein Werk von möglichst reichem Inhalte auch möglichst wohlfeil herzustellen, nicht so schnell ausgeführt. Von Jahr zu Jahr befestigte ich daher bei mir selbst den Plan, arbeitete sowohl den Text als die zahlreichen und compendiösen Zeichnungen einzelner Parthieen so lange aus, bis ich so weit war, eine schnelle Fortsetzung versprechen, und meinen werthen Herren Zuhörern und allen Anfängern und Freunden der Wissenschaft, die man vorzugsweise die liebenswürdige nennt, ein Büchlein liefern zu können, welches durch seine Zweckmässigkeit, Compendiosität und Wohlfeilheit ihren Wünschen entsprechen dürfte.

Der *Plan* ist folgender:

Ein *compendiöses Taschenbuch* enthält in klarer, deutscher Sprache die Charakteristik der Gewächse der *Flora Deutschlands* durch alle Classen nach den Entwickelungsstufen des Gewächsreichs und nach den *daraus allein* hervorgehenden *natürlichen Verwandtschaften*, so wie ich diese auf einer grossen Wandtafel (*das Pflanzenreich* in seinen natürlichen Classen und Familien, Leipzig 1834 mit *zwei* Heften Text) auseinandersetzt habe, sorgfältig geordnet. Alles *häufig cultivirte* wird mit aufgenommen, alles *offizinelle* besonders bemerkt. Ein *Schlüssel* nach Linné's *Sexualsystem*, wie ich denselben schon in meiner *Flora germanica excursoria* gegeben und beifällig aufgenommen gesehen habe, wird auch hier den Anfänger bei der ersten Bestimmung der aufgefundenen Pflanze leiten, und die von mir selbst genau gezeichneten Analysen der *Gattungen* auf den in besondern Lieferungen mit kurzer Erläuterung erscheinenden zierlichen *Kupfertafeln*, werden ihn über die Richtigkeit seiner Bestimmung aufklären und der *Text* dann über die übrigen Verhältnisse der Species belehren, die er zu bestimmen versuchte. So glaube ich, wird vor der Hand dem seit lange beklagten Mangel eines solchen Buchs für den Anfänger abgeholfen werden und derselbe dann als Geübter mit Nutzen das Studium anderer Werke beginnen.

Die *Abbildungen* aller in meiner *Flora ger-*

manica von mir aufgeführten *Species*, welche ich bei Erscheinung dieser Flora zu geben versprach, sind inzwischen auch so weit fortgeschritten, dass nunmehr nach vollendeter Ausgabe *aller Gräser*, eine starke Lieferung jener Abbildungen mit den wohlgerathenen Portraiten der *Cruciferen* oder *Tetradynamae*, zu bequemer und billiger Anschaffung höchst compendiös zusammengestellt, vom Verleger der *Iconographia* und *Agrostograohia germanica* baldigst versendet werden wird. Diess Werk führt den Titel: „*Deutschlands Flora* mit Abbildungen aller *Arten*“ oder „*Flora germanica* iconibus omnium specierum illustrata.“ Manche neuere Mittheilung meiner geehrten Freunde ist auf diesen Tafeln dankbar der Benutzung Aller wiedergegeben worden, und Mancher wird sich durch dieselben überzeugen, dass er in der Deutung von mir beschriebener Arten sich irrte. Darum liess ich dergleichen sich oft selbst widersprechende Missdeutungen immer unbeantwortet und lege hier im Zusammenhange offen vor, was ich hatte und meinte, dem unpartheiischen Forscher zum sicheren Anhalt.

Dr. Ludwig Reichenbach.

Da Hr. Medizinal-Rath Dr. v. Frölich zu Ellwangen die auf sein Verlangen ihm zur Ansicht und Benutzung mitgetheilte Sammlung von *Hieracien* des Unterzeichneten schon zwei Jahre und darüber bei sich behält und alle direkte oder indirekte Bitten und Mahnungen nicht beachtet, oder auch nur beantwortet: so wird er hiermit nochmals öffentlich an seine Verpflichtung erinnert, und dieses unter den Botanikern ungewöhnliche Benehmen zur Warnung hiermit bekannt gemacht.

Leipzig im Mai 1837.

Dr. G. Kunze,
Prof. der Botanik.

Desiderata Hampeana.

Leskea brachyclados Schwægr.
— exilis Stark.
— Frölichii Brid.
— pallescens Sw. c. fr.
— julacea Brid.
Hypnum obtusatum Whlb.
— protuberans Br.
— alpestre Sw.
— plicatum Schl. c. fr.
— adnatum Hedw.
— cirrhosum Schw. c. fr.
— nemorosum Koch.
— neglectum Schw.
— bavaricum Voit.
— contiguum Nees a. Es.
— heterophyllon Hüb.
— capillaceum Br.
Anomodon nervosus Fürnr. c. fr.
Leucodon morensis Schr.
Fissidens dicarpos Brid.
Bryum boreale Schwægr.
Webera pulchella.
— rubella.
— cucullata.
Pohlia curviseta.
— arcuata.
— xanthocarpa.
— pulchella.
Orthotrichum stramineum Br.
Encalypta cylindrica Fk.
— microphylla Bryol.
Grimmia fusca et urceolaris Bryol.
Dermatodon cernuus Hüb.
Weissia Rudolph. Bryol.
— Schisti Schwægr.
— torquescens Brd. c. fr.
— procera Bryol.
— flexuosa Bruch.
Oncophorus conglomeratus Brid.
Dicranum strictum Schw.
— Hostianum —
— interruptum Brid.
— penicellatum.
— pyriforme Schultz.
— longipilum c. fr.
— cirratum Hornsch.
— paradoxum Fk.
Trematodon brevicollis Hedw.
Hymenostomum rutilans Hedw.
— subglobosum Bryol.
Phascum palustre Bruch.
— Lucasianum Bryol.
— tenerum Bruch.
Trichostomum nervosum.
— piliferum Sw.
— latifolium Schw.
— viridulum Br.

Vorstehende Moose in *vollständigen* Exemplaren aus dem Bereiche der deutschen Flora (incl. der Schweiz) würden mir im Tausch gegen Harzpflanzen oder exotische Kryptogamen sehr willkommen seyn.

Blankenburg a. H. März 1837. E. Hampe.

Inhalts-Verzeichniss.

I. Abhandlungen.

II. Ankündigungen und Anzeigen.

X. Notizen zur Zeitgeschichte.

XI. Preisaufgaben und Preisertheilungen.

XII. Reise-Berichte.

XIII. Todesfälle.

XIV. Versammlungen.

XV. Verzeichniss der Schriftsteller.

XVI. Verzeichniss der vorzüglichsten Pflanzennamen.

